

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 131
du 6 Octobre 1988

Processionnaires de pins : il faut traiter
Agrumes : attention des **ceratites** ont été
observées et les **cicadelles vertes** entrent
dans les vergers.

PINS :

Vous avez déjà remarqué l'hiver dernier des sortes de bourses blanches accrochées aux pins ? Au mois d'avril, vous avez vu les chenilles descendre en procession le long des troncs.

Il faut effectuer un traitement **dès la semaine prochaine**. Outre l'aspect inesthétique des arbres, vous risquez de voir les pins se dessécher progressivement et les chenilles aux poils urticants vous occasionner des démangeaisons.

Vous pouvez utiliser les spécialités suivantes :

* à base d'un insecticide biologique (*Bacillus thuringiensis*). Ces produits sont tout à fait inoffensifs vis à vis de l'environnement.

THURICIDE	PM	5 g/10 l d'eau
BACTOSPEINE	PM	6 g/10 l d'eau
DIPEL	PM	6 g/10 l d'eau

* à base d'insecticide chimique
DIMILIN (diflubenzuron) 3g/10 l d'eau

Renouvelez le traitement dans 15 jours si la population est abondante.

*** La Fédération des Groupements de Défense des Cultures de la Haute Corse peut mettre à la disposition des particuliers un appareil de traitement. Pour tout renseignement prendre contact avec son Président Monsieur FILIPPI. " La Rûche Foncière - ARENA-VESCOVATO ***

AGRUMES

**** mouche méditerranéenne des fruits (*ceratita capitata*)**

Habituellement peu fréquente, elle est observée cette année depuis quelques jours, dans les régions de MORIANI et SAN GIULIANO . Ailleurs (CASINCA, MARANA), on dénombre une population peu élevée, les pomelos semblent pour le moment plus attractifs que les clémentiniers. Cette mouche de 4,5 mm d'envergure et de 4 à 5 mm de long est redoutable !

La femelle pique les fruits pour y déposer ses oeufs. Les trous de pique entraînent la formation de taches rendant la production difficilement commercialisable.




FIG. 31. -- Mouche méditerranéenne, femelle (d'après BONNEMAISON).

Dans les régions de MORIANI et SAN GIULIANO un traitement s'impose dès maintenant. La meilleure méthode est d'effectuer un mélange d'**hydrolysat de protéines** à 1 % (BUMINAL) + un insecticide le **fenthion** (LEBAYCID) et de pulvériser de grosses gouttes, sur une partie de l'arbre. D'autres matières actives peuvent également être utilisées : **dimethoate, formothion, malathion, trichlorfon.**

Dans les autres régions où les captures sont faibles à nulles, attendre un prochain bulletin.

++ Si vous envisagez une lutte dirigée à la fois contre les cératites et les cicadelles, préférez le **fenthion** ou le **formothion**.

**** cicadelles vertes**

Elles se déplacent des vignes vers les agrumes, dès que les vendanges sont terminées.

--> Si vos parcelles sont voisines des vignes, intervenez sans tarder dès la fin des vendanges.

Vous pouvez utiliser les spécialités suivantes :

formothion	ANTHIOFORT
dimethoate	ROGOR
	PERFEKTION VITEX
cypermethrine	RIPCORD, MASTOR, CYMBUSH,
	SHERPA, KAFIL
chlorpyrifos + dimethoate	FINETHYL, SALUT
methomyl	LANNATE, METOVER
methidathion	ULTRACIDE
deltamethrine	DECIS

ou des spécialités à base de parathion.

---- > Si les brise vents sont constitués d'essences autres que des casuarina et s'ils sont en bon état, vous pouvez ne traiter que les brise vents avec du parathion à 60 g/hl.

--> Si les parcelles d'agrumes sont éloignées des vignes, vous pouvez encore attendre avant d'effectuer ce traitement . Les captures dans nos postes de piègeage sont peu nombreuses.

Un prochain bulletin fera le point.